

# Plastalgin

*Präzisionsalginat  
Abdruckmaterial*

STAUBFREI  
NORMALABBINDEND

#### MISCHUNGSVERHÄLTNISSE

Immer auf folgendes Verhältnis achten : 1 voller Dosier-Löffel Pulver (8 g) zu 1/2 Dosis Wasser (20,5 ml). Um das Pulver abzumessen, den Messbecher mit überschuss füllen, niemals zusammen drücken, und mit dem Spatel glattstreichen. Pulver und Wasser werden 45 Sekunden zusammen angemischt.

Zum ausschließlichen Verkauf an Zahnärzte.  
Kühl und trocken aufbewahren.

CE



Inhalt : 454 g

# Plastalgin

*Alginate for accurate  
impression taking*

DUSTFREE  
NORMAL SETTING

#### MIX RATIO

Always keep to the proportion of one measure of powder (8 g) to a half-measure of water (20,5 ml). To measure the powder, fill a measure full and level it without compressing, using a spatula. Mix the powder and water for 45 seconds.

For professional use only in the practice of dentistry.  
Keep in a cool and dry place.

CE



Contents : 454 g

# Plastalgin

*Alginate pour  
empreintes de précision*

SANS POUSSIÈRE  
PRISE NORMALE

#### PROPORTIONS DE MÉLANGE

Respecter toujours la proportion de 1 mesure de poudre (8 g) pour une demi-mesure d'eau (20,5 ml). Pour mesurer la poudre, remplir la cuillère-doseuse et araser avec la spatule, sans tasser. Mélanger poudre et eau pendant 45 secondes.

Réservé à l'usage professionnel en art dentaire.  
A conserver dans un endroit frais et sec.

CE



Contenu : 454 g

# Plastalgin

*Alginato per impronte  
di precisione*

NON POLVEROSO  
PRESA NORMALE

#### PROPORZIONI D'IMPASTO

Rispettare sempre la proporzione di una dose di polvere (8 g) e mezza di acqua (ml 20,5). Per dosare la polvere, riempire il cucchiaino dosatore e rasarlo con una spatola senza pressare. Dopo aver aggiunto l'acqua, secondo le dosi, spatolare per almeno 45 secondi.

Prodotto riservato esclusivamente agli specialisti in stomatologia e in odontoiatria.  
Conservare in luogo fresco e al riparo dall'umidità.

CE



Contenuto : 454 g

# Plastalgin

*Alginato para  
impresiones de precisión*

SIN POLVO  
FRAGUADO NORMAL

#### PROPORCIÓN AGUA - POLVO

Es aconsejable respetar siempre la proporción de una dosis de polvo (8g) con una semimedida de agua (20,5 ml). Para medir el polvo, llenar una cucharadita de polvo colmadamente y enrasar con la espátula sin comprimir. Amasar durante 45 segundos.

Producto reservado exclusivamente para el uso del especialista en odontostomatología.  
Consérvese en lugar fresco y seco.

CE



Contenido : 454 g